

Wintertarwerassen

EH 0005

Door: ir.L.van den Brink, PAV

Inleiding

Het afgelopen groeiseizoen 1999/2000 heeft het PAV, deels samen met de kweekbedrijven rassenproeven uitgevoerd op negen lokaties in Nederland. De lokaties lagen verspreid over vijf regio's. Op elke lokatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd. Voor de Noordelijke zeeklei lag één van de twee rassenproeven op de proefboerderij Ebelsheerd. In deze proef waren 28 rassen gezaaid. Het groeiseizoen 2000 kenmerkte zich door een zachte winter en een vrij koele zomer. Alleen bladvlekkenziekte speelde dit seizoen een rol. De aantasting door fusarium bleef beperkt. In tabel 1 staan de belangrijkste raseigenschappen en de gemiddelde opbrengsten met en zonder ziektebestrijding over de jaren 1995 t/m 2000 voor de Noordelijke klei weergegeven.

Tabel 1: Overzicht van de belangrijkste raseigenschappen bij wintertarwe (1997/2000) en de relatieve korrelopbrengst met en zonder ziektebestrijding op de Noordelijke zeeklei (gemiddeld over de jaren 1995 t/m 2000)

winter vasth.	stevig heid	vroeg rijp	gele roest	bruine roest	dauw	meel vlek	blad- rium	fusa- schim.	zwart	opbrengst met	rel.* zonder
betere baktarwe:											
Hereward	6.5	9	6	9	8	7	6.5	6.5	6	94	97
baktarwe:											
Tambor	8.5	7.5	6.5	8.5	8	8.5	7	7.5	6.5	93	101
Bercy	8	7	8	7	7.5	7	4.5	4	5	98	97
Residence	8	6	7.5	9	8.5	7.5	6.5	7	6	102	103
Semper	7.5	6.5	6.5	9	8	7.5	7	7.5	6.5	100	104
Drifter	8	7.5	7	9	7.5	7	5.5	6.5	6.5	108	104
Virtuose	..	8	8.5	9	9	8	6.5	6.5	6	104	108
vultarwe:											
Versailles	6.5	7.5	6.5	8	5	6	6	5	5.5	101	96
Ritmo	7	8.5	6	5	4.5	6	5.5	5	6	101	93
voertarwe:											
Vivant	6.5	8	6.5	9	8	6	6	5.5	5.5	101	98
Tower	7.5	6	7	8.5	8.5	8	6	7	6	98	99
Harrier	6.5	8	6	2.5	8.5	7	6	7	6.5	102	99
Farandole	7	7	8.5	9	8.5	7.5	6	5	5.5	105	110
Napier	..	8.5	6.5	8.5	9	7	6	5.5	5.5	107	105
2 jaar in onderzoek:											
CEB 9703 (Kampa)										100	105
*100%= ...kg/are met resp. zonder ziektebestrijding										10.3	8.4

Om tot een goede rassenkeuze te komen moeten alle eigenschappen meegenomen worden, voor zover van belang voor het betreffende gebied. Daarnaast kan het goed zijn om op een bedrijf niet één maar twee of drie rassen te kiezen. Dit geeft een zekere risicospreiding. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Beschrijvende rassenlijst.