

## Wintertarwerassen

EH 0303

Door: ir.L.van den Brink, ing.J.Paauw, PPO

### Inleiding

Het afgelopen teeltseizoen 2002/2003 heeft het PPO een 28 tal wintertarwerassen onderzocht op verschillende grondsoorten. Dit heeft geleid tot de opname van twee nieuwe rassen op de rassenlijst. De locaties lagen verspreid over vijf regio's. Op elke locatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd. Voor de Noordelijke zeelei lag één van de proeven op de proefboerderij Ebelsheerd.

Tabel 1: Overzicht van de belangrijkste raseigenschappen bij wintertarwe (2000/2003) en de relatieve korrelopbrengst met en zonder ziektebestrijding op de Noordelijke zeelei (gemiddeld over de jaren 1998 t/m 2003)

	winter vasth.	stevig heid	vroeg rijp	gele roest	bruine roest	meel dauw	blad- vlek	fusa- rium	zwart schim.	opbrengst met	rel.* zonder		
<b>baktarwe:</b>													
Drifter	8	7.5	7.5	7.5	5.5	6.5	5.5	6.0	6.5	103	99		
Kampa	-	8	5.5	8.5	6.5	8.0	7.0	8.5	6.5	96	97		
Semper	7.5	6.5	7.0	9	6.5	7.5	6.5	7.0	6.5	98	99		
Residence	8	6	7.5	9	6.5	7.5	6.5	7.0	6.5	99	97		
Ilias	-	8	6.5	9	7.0	7.0	6.5	8.0	6.5	98	99		
Tataros	-	8	7.5	9	8.0	7.5	6.0	6.0	6.5	106	110		
<b>vultarwe:</b>													
Ritmo	7	8	6	5	4.5	6.0	5.5	5.0	6	98	84		
<b>overige tarwe:</b>													
Bristol	-	8.5	6.5	8.5	8.5	8.5	7	7.0	6.5	100	105		
Napier	-	8.5	6.5	8	8.5	7.0	5.5	5.5	5.5	103	99		
Vivant	6.5	8	6.0	7.5	6.5	6.0	6	5.0	6.0	97	94		
Virtuose	-	8.0	8.5	8	8	7.0	6	6.5	6	102	103		
Farandole	7	7.5	8.5	8	8.5	7.5	6	5.0	6.5	100	104		
Tulsa	-	8.5	6.0	9	8.5	8.5	7	6.5	6.5	100	103		
Limes	-	8	7	8.5	8.0	7.0	6	6.5	5.5	101	107		
Koch **	-	7.5	6.5	9	8.5	9.0	7	6.0	6.5	103	109		
Harlem **	-	8.0	7.5	9	8.5	7.5	6	6.5	6.0	102	103		
<b>2 jaar in onderzoek:</b>													
Robigus	-	8.5	5.5	6.5	9	9.5	6.5	5.5	6.5	106	114		
Globus	-	8.0	6.5	9.5	8.5	8.0	7	6.5	7	102	105		
*100%= ...kg/are										met resp.	zonder ziektebestrijding	10.7	8.8

\*\* nieuw op de rassenlijst

Om tot een goede rassenkeuze te komen moeten alle eigenschappen meegewogen worden. Bij de meeste telers zal de tarwe geteeld worden met ziektebestrijding. In de opbrengsttabel geeft dan ook de kolom met ziektebestrijding hiervoor de beste informatie. Daarnaast kan het goed zijn om op een bedrijf niet één, maar twee of drie rassen te kiezen. Dit geeft een zekere risicospreiding. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Beschrijvende rassenlijst.