

## 2 Het cultuur- en gebruikswaarde onderzoek in zomergerst

In 2006 werd de coördinatie van het landelijke gebruikswaarde- en cultuuronderzoek in granen uitgevoerd door SPNA. Het onderzoek vond plaats in wintertarwe, triticale, zomergerst en zomertarwe. Het rassenbulletin van zomergerst wordt hier weergegeven:

### 2.2 Zomergerst rassenlijstcijfers 2007

In dit rassenbulletin staan de opbrengsten en eigenschappen weergegeven van zomergerstrassen. Deze rassen zijn in 2006 onderzocht op 6 locaties, verspreid over Nederland. In de tabel zijn de eigenschappen (gemiddeld over de jaren 2003 t/m 2006) en de opbrengsten, zowel met als zonder ziektenbestrijding (gemiddeld over de jaren 2001 t/m 2006), weergegeven.

#### Overzicht van de rasseneigenschappen bij zomergerst (gemiddeld over de jaren 2003 t/m 2006)

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap.

In het gele vlak staan de cijfers van de rassen die niet in de rassenlijst 2006 waren opgenomen.

	Lengte stro (rel)	Stevigheid <sup>1)</sup>	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Resistentie tegen:			Kwaliteitsgegevens <sup>2)</sup>					
					Meeldauw <sup>1)</sup>	Netvlekkenziekte	Bladvlekkenziekte	Brouwkwaliteit	Volgerst	Eiwit	DKG		
<b>Brouwgerst</b>													
A	Arcadia	102	8,0	7,5	6,5	8,0	7,0	7,5	7,0	101	97	106	
A	Class	101	8,5	8,0	7,0	9,0	6,5	7,0	8,0	101	98	104	
A	Prestige	100	8,0	8,0	7,0	9,0	5,5	7,0	7,0	100	100	103	
B	Barke	107	6,5	6,5	6,5	9,0	7,0	7,0	8,0	100	100	101	
B	Cellar	97	7,0	7,0	7,0	9,0	6,0	6,5	8,0	101	98	102	
B	Extract	103	7,5	6,0	6,0	8,5	7,0	7,0	8,0	..	..	..	
B	Reggae	98	8,5	6,5	6,5	9,0	6,5	5,5	7,0	98	98	96	
<b>Nieuw rassenlijst 2007</b>													
N	Erlina (ceb 0374)	99	7,5	5,5	6,5	9,0	7,5	8,5	7,0	101	92	102	
N	Kuburas (ceb 0260)	100	8,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,5	7,0	100	93	99	
N	Tipple (NFC 401-11)	93	8,0	6,0	6,0	9,0	7,0	7,0	7,0	101	93	104	
<b>Voergerst</b>													
A	Arcadia	102	8,0	7,5	6,5	8,0	7,0	7,5					
A	Class	101	8,5	8,0	7,0	9,0	6,5	7,0					
B	Saloon	91	8,5	6,5	6,5	9,0	7,0	8,0					
<b>Rassen in onderzoek (2 jaar)</b>													
	Ceb 0422	99	..	6,5	7,0	..	6,5	5,5					
	Ceb 0553	101	..	6,5	6,5	..	7,0	7,5					
	Kangoo	103	..	6,5	6,5	..	7,5	7,0					
	Poet	97	..	6,0	6,0	..	7,0	6,5					
	Poker	101	..	6,5	6,0	..	7,0	8,5					
		100 = ..cm	77						100 = .%;%;gr	97	9,9	47,4	

1) Rassenlijstcijfers zijn ongewijzigd t.o.v. rassenlijst 2006, omdat er geen nieuwe waarnemingen toegevoegd zijn.

2) Kwaliteitsgegevens hebben betrekking op de onderzoeksjaren 2000 t/m 2005.

Overzicht van de opbrengst bij zomergerst (gemiddeld over de jaren 2001 t/m 2006)

		Opbrengst klei (rel)		Opbrengst zand (rel)	
		met ziektenbestr.	zonder ziektenbestr	met ziektenbestr.	zonder ziektenbestr
<b>Brouwgerst</b>					
A	Arcadia	99	101	102	99
A	Class	103	101	97	100
A	Prestige	102	102	97	98
B	Barke	95	96	93	95
B	Cellar	100	100	95	95
B	Extract	97	96	93	92
B	Reggae	99	96	95	90
<b>Nieuw rassenlijst 2007</b>					
N	Erlina (ceb 0374)	106	105	100	100
N	Kuburas (ceb 0260)	106	105	96	96
N	Tipple (NFC 401-11)	110	108	101	101
<b>Voergerst</b>					
A	Arcadia	99	101	102	99
A	Class	103	101	97	100
B	Saloon	103	103	101	100
<b>Rassen in onderzoek (2 jaar)</b>					
	Ceb 0422	105	103	101	101
	Ceb 0553	102	101	99	97
	Kangoo	105	105	101	103
	Poet	106	103	104	101
	Poker	103	103	102	100
100 = .Ton/ha		8,0	7,6	6,7	6,3