

Zomertarwerassen

Door: ir.L.van den Brink, PAV

In 1998 heeft het onderzoek naar zomertarwerassen plaats gevonden op vier lokaties in Nederland, waarvan drie op kleigrond en één op zandgrond.

Voor de zaadopbrengst is het gemiddelde van de jaren 1993 t/m 1998 gegeven. Voor de eigenschappen wordt het gemiddelde van de jaren 1995 t/m 1998 gegeven. Tenzij anders vermeld betekenen hoge cijfers een gunstige waardering van de betrokken eigenschap.

Eigenschappen (gem.1995/1998) en zaadopbrengst (gem.1993/1998) van zomertarwe

stevig heid	vroeg rijph.	gele roest	bruine roest	meel- dauw	blad- vlekk	afrijping ziekte	klas. kwal.	opbrengst klei	
Betere									
baktarwe									
N Lavett	8	8	6 ⁵	7 ⁵	8	6	7	8 ⁵	98
Baktarwe									
A Baldus	8	8	6	8	6	6	6	7	100
A Minaret	6 ⁵	7 ⁵	5	5	7	6	6 ⁵	7 ⁵	96
N Anemos	7 ⁵	6 ⁵	6 ⁵	7	7 ⁵	6 ⁵	7 ⁵	8	102
Voertarwe									
N Cadenza	9	5	6 ⁵	7 ⁵	6 ⁵	6	5	6 ⁵	104
100= ...kg/are									78,1